

Comparison of the Inhibitory Control Ability in Children with Stuttering and Normal Peers

*Esfandeh K¹, Hajvalii Gh², Farhangdoost H³

Author Address

1. Master of Science in Speech and Language Pathology, Lecturer, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran;
2. Master of Science in Physiotherapy, Lecturer, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran;
3. PhD of neurosciences, Assistant professor, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

*Corresponding Author's Email: ksfande@gmail.com

Received: 2019 May 21; Accepted: 2019 Aug 17.

Abstract

Background & Objective: Inhibition refers to the ability to actively suppress, interrupt or delay an action. Several authors have shown a possible role for self-regulatory processes, attentional control processes, and more specifically inhibitory control in the development of stuttering. Inhibition control (IC) is essential for doing daily tasks and implicate in cognitive development, executive functioning and the conscious use of attention or attentional control. Inhibition control relates to the coordination and integration of mental processes in successful task doing and plays an important role in the self-regulation of emotional states. Children who stutter (CWS) have low adaptability, lower in biological rhythmicity and less efficient in emotional regulation. Based on role of IC in speech motor planning and production, study in this field is important. The aim of this study was to investigate differences in inhibitory control performance between CWS and children who not stutter (CWNS).

Methods: This cross sectional study investigated inhibitory control ability of 30 children diagnosed with developmental stuttering and 30 typically developing nonstuttering children aged 7–13 in Tehran (capital city of Iran), matched by age and gender to the children who stutter. All children were monolingual speaking (Persian). All participants had normal or corrected to normal vision and normal speech and language development (except for stuttering in the experimental group), based on the criteria described below. Participants had no known or reported neurological, psychological, developmental or hearing problems. Auditory Go/No Go task was used that assess to inhibitory control in CWS and CWNS. One of two easily discriminated auditory stimuli –the low frequency tone (1000 Hz) and high frequency tone (1300 Hz) – is randomly presented for 100 milliseconds. Pairs corresponding to trials present stimuli. Inter-stimulus interval in a pair was equal to 1000 millisecond. Two different pairs of stimuli are presented only: Low-Low pair (“Go” trial) and Low-High pair (“Nogo” trial). Trials presented at random order with 50% probability. Subject has to press a button (right arrow key) as soon as possible in case of presentation of Low-Low pair and ignore Low-High pairs of stimuli. The total number of trials was equal to 480. The parameters of performance were calculated for Go and No Go condition. Data analysis in this cross sectional study was done using descriptive-analysis statistics such as independent sample T-test, Mann-Whitney test and Pearson correlation coefficient test using SPSS program 24 series.

Results: Mean percentages of Commission errors and Omission errors were higher in the stuttering group (M=10.47, SD=13.09), (M=30.21, SD=15.11) than in the nonstuttering group (M=8.02, SD=6.17), (M=24.66, SD=13.73). Nevertheless, there was not any significant differences in Commission errors and Omission errors statically. The mean reaction time was higher in the stuttering group than in the nonstuttering group (M=627.06, SD=73.9) (M=615.4, SD=53.37). However, the mean reaction time for CWS and CWNS was not significantly different.

Conclusion: According to results obtained in this study, based on auditory Go/No Go task, showed that CWS and CWNS not differ in inhibitory control. CWS had lower mean in inhibitory control, which suggests a lowered ability to inhibit prepotent response tendencies. The findings were showed that inhibitory control ability had important role in persistent developmental stuttering. CWS, who exhibit a lowered IC, would most likely exhibit difficulties in suppressing prepotent responses across a variety of settings (school setting, playing with a friend). Therefore it might be important to council parents that these children may have more difficulties dealing with everyday situations requiring response inhibition (following instructions, waiting for something, ending an activity), resulting in increased emotional arousal.

Keywords: Auditory Go/No Go, Inhibitory control, Developmental stuttering.

بررسی و مقایسه توانایی کنترل بازداری در کودکان دارای لکنت و همسالان طبیعی

*کوثر اسفنده^۱، غلامرضا حاج ولیی^۲، هاشم فرهنگ دوست^۳

توضیحات نویسندگان

۱. کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، مربی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران؛

۲. کارشناسی ارشد فیزیوتراپی، مربی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران؛

۳. دکترای تخصصی علوم اعصاب، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران.

* رابانامه نویسنده مسئول: ksfande@gmail.com

تاریخ دریافت: ۳۱ اردیبهشت ۹۸؛ تاریخ پذیرش: ۲۶ مرداد ۹۸

چکیده

زمینه و هدف: بازداری به معنای توانایی فعالانه متوقف کردن یا تأخیر فعالیت است. چندین محقق به نقش ممکن فرایندهای خودتنظیمی و فرایندهای کنترل توجه و به ویژه کنترل بازداری در رشد لکنت اشاره کرده اند. هدف این پژوهش بررسی تفاوتها در عملکرد کنترل بازداری بین کودکان لکنتی و غیرلکنتی بود.

روش بررسی: در این پژوهش مقطعی مقایسه ای، توانایی کنترل بازداری ۳۰ کودک ۱۳ تا ۷ ساله شهر تهران با تشخیص لکنت رشدی و ۳۰ کودک غیرلکنتی رشد یافته طبیعی که به لحاظ سن و جنس با کودکان لکنتی تطابق داشته با استفاده از تکلیف پرو-بایست شنیداری ارزیابی شد. تحلیل اطلاعات از طریق آمار توصیفی تحلیلی از جمله آزمون تی مقایسه میانگین های دو گروه مستقل و آزمون من ویتنی و آزمون همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ صورت گرفت. در تمامی آزمون ها سطح معناداری کمتر از ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته ها: تفاوت های بین گروهی برای خطاهای ارتکاب و خطاهای بازداری نشان داد میانگین درصد خطاهای ارتکاب و بازداری در گروه لکنتی (۱۰/۴۷±۱۳/۰۹) و (۳۰/۲۱±۱۵/۱۱) در مقایسه با گروه غیرلکنتی (۸/۰۲±۶/۱۷) و (۲۴/۶۶±۱۳/۷۳) بیشتر به دست آمد؛ اما از نظر آماری تفاوت های معناداری نداشت. همچنین میانگین زمان واکنش بیشتری، در گروه لکنتی (۶۲۷/۰۶±۷۳/۹) در مقایسه با گروه غیرلکنتی (۶۱۵/۴±۵۲/۳۷) مشاهده شد؛ ولی این تفاوت میانگین در کودکان لکنتی و غیرلکنتی از نظر آماری معنادار نبود.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش براساس تکلیف پرو-بایست شنیداری، مشخص کرد کودکان لکنتی و غیرلکنتی در کنترل بازداری تفاوت معناداری ندارند. بین دو گروه کودکان دارای لکنت و غیرلکنتی در متغیرهای ارتکاب و بازداری و زمان واکنش تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه ها: پرو-بایست شنیداری، کنترل بازداری، لکنت رشدی.

است؛ یعنی تسهیل یا بازداری-واکنش پذیری ذکرشده در قسمت قبل و در پرسشنامه رفتاری کودکان با مقیاس‌هایی مثل کنترل بازداری و تمرکز/انتقال توجه اندازه‌گیری می‌شود (۶).

در مطالعه‌ای بر کودکان ۳ تا ۸ ساله، محققان دریافتند کودکان مبتلا به لکنت به شکل درخور توجهی در مقیاس‌های مرتبط با خودتنظیمی و کنترل بازداری و انتقال توجه سطح ضعیف‌تری داشتند. این یافته مطابق با سایر مطالعات مبتنی بر پرسشنامه در کودکان دارای لکنت است (۷، ۸).

در پژوهشی ایگرز و همکاران بررسی کردند آیا کنترل بازداری و سطح خودتنظیمی کمتر گزارش شده توسط والدین کودکان دارای لکنت، می‌تواند با استفاده از تکالیف معیارهای فرایندهای مربوط به توجه ارزیابی شود (۹) که در رأس این فرایندها، رفتارهای خودتنظیمی قرار دارد (۱۰). با به‌کارگیری نسخه کودک آزمون شبکه توجه (ANT) که تکلیفی کامپیوتری برای اندازه‌گیری کارایی سه شبکه توجه است (۱۱)، نتایج نشان داد در کودکان با لکنت به شکل چشمگیری، شبکه جهت‌یابی که مرتبط با مقیاس توجه انتقالی پرسشنامه رفتاری کودکان بوده، سطح کارایی کمتری دارد (۹). برای شبکه کنترل اجرایی، شبکه اصلی کنترل بازداری، شواهدی از عملکرد ضعیف‌تر در کودکان دارای لکنت یافت شد؛ البته تفاوت معنادار نبود. این موضوع اشاره می‌کند یافته‌های قبلی بیان شده از کنترل بازداری مبتنی بر CBQ، مرتبط با کارایی ضعیف‌تر شبکه کنترل اجرایی نبوده یا اینکه الگوی استفاده شده برای بررسی شبکه توجهی اجرایی در مطالعه قبلی فاقد قدرت لازم جهت تشخیص تفاوت‌های معنادار بین گروهی است (۹).

ابزارهای متعددی برای ارزیابی توانایی کنترل بازداری وجود دارد و چندین اندازه‌گیری آزمایشگاهی به منظور بررسی کنترل بازداری در سنین مختلف انجام شده است؛ مثل تکلیف‌های برو-بایست^۶ یا ایست-علامت^۷ و الگوهای مشابه استروپ یا مرتب‌کردن کارت‌ها و تکالیف هدایای اشتباهی^۸ یا هدایای تأخیری^۹ (۱۲، ۲).

هدف این مطالعه بررسی دقیق‌تر یافته‌های قبلی گزارش شده توسط والدین (CBQ) از تفاوت‌ها در کنترل بازداری بین کودکان دارای لکنت و کودکان بدون لکنت، به‌خصوص بازداری از پاسخ‌های غالب با استفاده از تکلیف برو-بایست شنیداری^۹ بود.

۲ روش بررسی

در این پژوهش مقطعی مقایسه‌ای شرکت‌کنندگان را ۳۰ کودک ۷ تا ۱۳ ساله (۲۱ پسر و ۹ دختر) دارای لکنت دوران رشد و ۳۰ کودک غیرلکنتی رشد یافته طبیعی تشکیل دادند که با کودکان مبتلا به لکنت از نظر سن و جنس تطابق داشتند. به دلیل محدود بودن میزان دسترسی به کودکان لکنتی در بازه سنی تحقیق و محدودیت زمان نمونه‌گیری و وجود معیارهای ورود به مطالعه جهت تعیین ویژگی‌های نمونه مدنظر، پژوهش به روش نمونه‌گیری دردسترس یا آسان انجام شد. محاسبه

کنترل بازداری، توانایی بازداری یا متوقف کردن فرایندهای تفکری برجسته و آشکار یا فعالیت‌هایی است که با هدف یا تکلیف در حال انجام، مرتبط نیست (۱). همچنین کنترل بازداری قادر بودن جهت بازداشتن پاسخ‌هایی بوده که نامرتب با محرک است و با تفاوت‌های فردی و تغییرهای رشدی یا هر دو، در طیف وسیعی از توانایی‌های شناختی شامل هوش، توجه، حافظه و درک خواندن و نیز عملکرد در تکالیف متنوع پیازه ارتباط دارد. از سوی دیگر عملکرد بازداری در رشد تنظیم عاطفی و آگاهی و کفایت اجتماعی دخالت داشته و نقش مهمی در خودتنظیمی وضعیت‌های عاطفی ایفا می‌کند (۲). پژوهش‌های قبلی به نقش ممکن فرایندهای خودتنظیمی و کنترل توجه و به‌خصوص کنترل بازداری در رشد لکنت پرداخته‌اند. شواهد مربوط به کاهش سه مؤلفه مذکور از ملاحظه کودکان با لکنت نشان داد که آن‌ها تطابق‌پذیری و تنظیم بیولوژیکال ضعیف‌تری داشته و در تنظیم عاطفی براساس کنترل، توجه کارآمدی کمتری دارند (۳). همین‌طور مطالعات گزارش کردند برای کودکان مبتلا به لکنت می‌توان گفت: ۱. بسته به روش اندازه‌گیری استفاده شده در مقایسه با کودکان غیرلکنتی حواس‌پرتی کمتر یا بیشتری دارند؛ ۲. در تنظیم توجه دارای کارایی کمتری هستند؛ ۳. در جهت‌یابی توجه کارآمدی کمتری دارند. پژوهش‌های مربوط به بزرگسالان لکنتی نیز بیان می‌کند این افراد در تخصیص منابع توجه در حین انجام تکلیف‌های دوگانه، کارایی کمتری را در مقایسه با گروه کنترل نشان می‌دهند (۳).

تحقیق‌های مختلف نتایج متناقضی درباره تفاوت در قادر بودن کنترل بازداری بین کودکان عادی و مبتلا به لکنت گزارش کرده‌اند؛ بنابراین مطالعه بیشتر در زمینه توانایی کنترل بازداری در لکنت به دلیل نقش چشمگیر آن در طرح‌ریزی حرکتی و تولید گفتار، بسیار جالب توجه است. هرچند مطالعات تصویربرداری در لکنت، فعالیت نابهنجار را در ساختارهای قشری و زیرقشری مربوط به کنترل بازداری یعنی کورتکس پیش‌پیشانی راست^۱ و حلقه پیشانی-عقدۀ قاعده‌ای^۲ عنوان می‌کند (۳).

در تعدادی از پژوهش‌ها، شواهدی مبنی بر نقش ممکن کنترل بازداری در لکنت رشدی گزارش شده است (۳، ۴). این مطالعات با استفاده از پرسشنامه رفتاری کودکان^۳ (CBQ) صورت گرفته (۵) که پرسشنامه خلق و خوی بیان شده توسط والدین برای کودکان خردسال مبتنی بر مدل خلق و خوی راتبرت است. راتبرت خلق و خوی را براساس تفاوت‌های فردی در واکنش‌پذیری و خودتنظیمی توصیف می‌کند (۵، ۶).

واکنش‌پذیری شامل پاسخ‌های حرکتی و عاطفی و توجهی بوده که به محرک داخلی و خارجی داده می‌شود و در مقیاس‌های پرسشنامه رفتاری کودکان با گزینه‌هایی مانند نزدیک شدن و عصبانیت/ناامیدی مشخص شده است. خودتنظیمی فرایندهایی برای تعدیل و تنظیم کردن

6. stop-signal

7. Mistaken Gift

8. Gift Delay

9. Auditory Go/NoGo

1. Right Prefrontal Cortex

2. Fronto-Basal Ganglia Circuit

3. Children's Behavior Questionnaire

4. Attention Network Test

5. Go/NoGo

حجم نمونه توسط فرمول صورت گرفت؛ بنابراین باتوجه به سطح خطای ۵ درصد و توان آزمون برابر ۸۰ درصد و نیز با استناد به مطالعه ایگز و همکاران (۱۳) و با در نظر گرفتن میانگین خطای بازداری در دو گروه ۳/۶۶ و ۷/۵۰ و انحراف معیار ۳/۷۵ و ۵/۳۴، حجم نمونه در هر گروه دست کم ۳۰ نفر برآورد شد.

همه کودکان تک‌زبانه و فارسی‌زبان بودند و تاریخچه رشد گفتار و زبان طبیعی داشتند (به جز وجود لکنت در گروه بررسی شده). همچنین شرکت‌کنندگان هیچ‌گونه شواهدی از مشکلات عصب‌شناختی، روان‌شناختی/عاطفی، رشدی یا شنوایی نشان ندادند. کودکانی با بروز هریک از مشکل‌های مذکور که باتوجه به سن و سطح رشدشان غیرطبیعی بوده، از مطالعه خارج شدند.

انتخاب آزمودنی‌های مبتلا به لکنت از میان مراجعانی بود که در فاصله زمانی اجرای تحقیق به کلینیک‌های گفتاردرمانی در شهر تهران و کلینیک‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی ایران، علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کردند. همچنین انتخاب گروه کودکان عادی، از مدارس دخترانه و پسرانه شهر تهران صورت گرفت که به لحاظ سن، جنس، پایه تحصیلی، وضعیت برتری طرفی دست و هوش بهر با گروه کودکان ناروان همسان شدند.

قبل از انجام ارزیابی‌ها، رضایت‌نامه و پرسشنامه جهت تکمیل در اختیار خانواده قرار گرفت. به منظور بررسی شدت لکنت، از ابزار سنجش شدت لکنت رایلی و ویرایش چهارم^۱ استفاده شد که در سال ۱۳۹۰ در ایران، طهماسبی و همکاران رویایی و پایایی آن را گزارش کردند (۱۴). نمونه‌گفتار پیوسته از کودک ثبت و از او خواسته شد تا در زمینه موضوع علاقه خود صحبت کند. سپس متن خواندن ارائه شد. جهت ثبت گفتار کودکان دوربین فیلم‌برداری به کار رفت تا رفتارهای همراه کودکان لکنتی نیز ثبت شود و دست کم ۱۵ تا ۲۰ دقیقه به این منظور اختصاص داده شد. بررسی شدت لکنت هر آزمودنی براساس جدول مربوط به ثبت شدت لکنت رایلی^۲ با پنج درجه خیلی خفیف، خفیف، متوسط، شدید و خیلی شدید صورت پذیرفت. به منظور ارزیابی هوش از آزمون تجدیدنظرشده هوشی و کسلر برای کودکان (ویسک-آر) استفاده شد (۱۵). مقیاس مذکور از دوازده خرده‌آزمون تشکیل شده است که دو آزمون آن جنبه ذخیره‌ای دارد. این دوازده خرده‌آزمون را می‌توان براساس ویژگی‌های کلامی یا غیرکلامی به دو گروه تقسیم کرد: شش زیرآزمون کلامی و شش زیرآزمون غیرکلامی. زیرآزمون‌های کلامی عبارت است از: اطلاعات؛ شباهت‌ها؛ حساب؛ واژه‌ها؛ ادراک (فهم)؛ حافظه ارقام. آزمون‌های عملی (غیرکلامی) شامل تکمیل تصاویر، ترتیب تصاویر، مکعب‌ها، تنظیم قطعات، تطبیق علائم و مازها می‌شود (۱۵).

ارزیابی کنترل بازداری از طریق تکلیف برو-بایست شنیداری بود. تکلیف در این روش شامل دو نوع محرک شنیداری، یکی با بسامد کم (۱۰۰۰ هرتز) و دیگری با بسامد زیاد (۱۳۰۰ هرتز) است. این دو محرک به صورت تصادفی در ۱۰۰ میلی‌ثانیه و به شکل زوج ارائه

می‌شود. به این ترتیب که یک‌جفت محرک شنیداری، محرک اول با بسامد کم-محرک دوم نیز با بسامد کم (آزمایش برو) و یک‌جفت محرک دیگر، محرک اول با بسامد کم-محرک دوم با بسامد زیاد (آزمایش نرو) است. لازم به ذکر است که بین دو محرک در یک‌جفت ۱۰۰۰ میلی‌ثانیه وقفه وجود دارد. آزمایش‌ها به ترتیب تصادفی انجام می‌پذیرد. وقفه بین آزمایش‌ها ۱۵۰۰ میلی‌ثانیه است. شرکت‌کننده باید به محض ارائه جفت محرک شنیداری با بسامد کم-کم، کلید فلش سمت راست در صفحه کلید کامپیوتر را فشار دهد و از جفت محرک شنیداری با بسامد کم-زیاد چشم‌پوشی کند. کل آزمایشات به تعداد ۴۸۰ آزمایش است. نمره‌دهی این تکلیف براساس تعداد و درصد خطای ارتکاب یا نبود بازداری مناسب (پاسخ‌دادن به No Go یا پاسخ اشتباه به Go) و تعداد و درصد بازداری یا از دست دادن جواب درست (پاسخ‌ندادن به Go) و زمان واکنش صورت می‌گیرد (۱۶).

در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده‌ها، نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۴ به کار رفت. ابتدا برای ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرهای عددی پیوسته تحت بررسی، از آزمون ناپارامتریک کولموگوف اسمیرنوف استفاده شد تا وضعیت یکی از پیش‌شرط‌های لازم برای انجام آزمون‌های پارامتریک مشخص شود. جهت دستیابی به هدف مطالعه ضمن به‌کارگیری شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، برای مقایسه پارامترهای تکلیف برو-بایست شنیداری خطاهای ارتکاب و خطاهای بازداری و زمان واکنش بین دو گروه کودکان لکنتی و غیرلکنتی، باتوجه به نرمال بودن متغیرهای خطاهای بازداری و زمان واکنش از آزمون تی مقایسه میانگین‌های دو گروه مستقل استفاده شد؛ ولی برای متغیر خطاهای ارتکاب که توزیع نرمال نداشتند از آزمون من‌ویتنی و جهت بررسی همبستگی بین متغیرهای کمی مطالعه شده، از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد. سطح معناداری در تمام آزمون‌ها برابر ۰/۰۵ بود.

۳ یافته‌ها

شرکت‌کنندگان مطالعه حاضر، کودکان ۷ تا ۱۳ ساله بودند که میانگین انحراف معیار سن دو گروه دارای لکنت دوران رشد و غیرلکنتی در جدول ۱ آمده است. نرمال بودن متغیرها با استفاده از آزمون کولموگوف اسمیرنوف محاسبه شد. نتایج مربوط به این آزمون در متغیرهای بازداری و مدت زمان اجرای آزمون تکلیف برو-بایست با مقادیر احتمال بیشتر از ۰/۰۵ بود که توزیع نرمال داده‌ها را نشان داد؛ اما برای متغیر خطاهای ارتکاب توزیع داده‌ها نرمال نبود. داده‌های حاصل از تجزیه و تحلیل هریک از پارامترهای آزمون در جدول ۲ ارائه شده است. کودکان لکنتی خطاهای بازداری بیشتری در مقایسه با گروه غیرلکنتی داشتند. به این صورت که میانگین در کودکان لکنتی در مقایسه با غیرلکنتی‌ها بیشتر به دست آمد؛ اما این تفاوت معنادار نبود ($p=0/142$). همچنین میانگین تعداد خطاهای ارتکاب در کودکان لکنتی بیشتر از کودکان غیرلکنتی مشاهده شد که تفاوت معناداری نداشت ($p=0/923$) (جدول ۲).

3. Commission
4. Omission

1. Stuttering Severity Instrument-4
2. Riley

جدول ۱. شاخص‌های میانگین و انحراف معیار نمونه‌های مطالعه‌شده براساس سن و بهره‌هوشی

متغیرها	گروه لکتی (۳۰)			گروه غیرلکتی (۳۰)		
	میانگین	انحراف معیار	حداقل	حداکثر	میانگین	انحراف معیار
سن (ماه)	۱۱۷/۵۷	۲۰/۵۲	۸۴	۱۵۲	۱۲۱/۴۰	۲۰/۲۲
بهره‌هوشی	۱۳۳/۹۰	۱۴/۴۹	۱۰۵	۱۵۵	۱۳۴/۵۳	۱۰/۳۵

جدول ۲. شاخص‌های آماری نتایج تکلیف برو- بایست شنیداری در کودکان لکتی و غیرلکتی

شاخص	گروه مطالعه‌شده	میانگین	انحراف معیار	(مقدار احتمال)	توان آزمون
بازداری	لکتی	۳۰/۲۱	۱۵/۱۱	۰/۱۴۲	۰/۴۴
	غیرلکتی	۲۴/۶۶	۱۳/۷۳		
ارتکاب	لکتی	۱۰/۴۷	۱۳/۰۹	۰/۹۲۳	۰/۱۷
	غیرلکتی	۸/۰۲	۶/۱۷		
زمان واکنش	لکتی	۶۲۷/۰۶	۷۳/۹	۰/۴۸۶	۰/۲۴
	غیرلکتی	۶۱۵/۴	۵۳/۳۷		

جهت بررسی همبستگی سن و متغیرهای آزمون برو- بایست شنیداری از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. براساس نتایج می‌توان گفت همبستگی معنادار و معکوسی بین سن و خطای بازداری در گروه کودکان مبتلا به لکت وجود دارد. در گروه کودکان دارای گفتار روان نیز ارتباط معنادار و معکوسی بین سن و خطای بازداری مشاهده شد. همچنین در دو گروه به‌صورت ترکیبی ارتباط معنادار و معکوسی بین سن و خطای بازداری و بین سن و خطای ارتکاب به‌دست آمد که بیانگر کاهش این خطاها با افزایش سن بود (جدول ۳).

میانگین مدت‌زمان اجرای آزمون در کودکان مبتلا به لکت طولانی‌تر از همسالان طبیعی به‌دست آمد و این تفاوت معنادار نبود ($p=0/486$) (جدول ۲). محاسبه‌ی توان براساس داده‌های تحقیق حاضر با آلفای ۰/۰۵ انجام شد. تعداد ۴۳۴ نمونه (در هر گروه ۲۱۷ نفر) لازم بوده تا توان ۸۰ درصد تفاوت احتمالی بین دو گروه تعیین شود. مقادیر مربوط به تحلیل توان در جدول ۲ آورده شده است. میزان کم توان محاسبه‌شده برای هریک از متغیرهای اصلی مشخص می‌کند توان برای نشان‌دادن تفاوت‌ها کم است و تعداد نمونه باید افزایش یابد تا توان کافی برای نشان‌دادن اختلاف‌ها به‌دست آید.

جدول ۳. ضریب همبستگی پیرسون بین سن و شاخص‌های تکلیف برو- بایست شنیداری در کودکان مبتلا به لکت دوران رشد و کودکان

گروه‌ها	شاخص	بازداری	ارتکاب	زمان واکنش
لکتی (۳۰ نفر)	ضریب همبستگی (r)	-۰/۲۹۰	-۰/۵۹۲	-۰/۰۶۵
	مقدار احتمال	۰/۱۲۱	۰/۰۰۱	۰/۷۳۰
غیرلکتی (۳۰ نفر)	ضریب همبستگی (r)	-۰/۴۲۵	-۰/۲۸۱	-۰/۰۳۳
	مقدار احتمال	۰/۰۱۲	۰/۱۳۲	۰/۸۶۱
لکتی و غیرلکتی (۶۰ نفر)	ضریب همبستگی (r)	-۰/۳۶۴	-۰/۳۴۲	-۰/۰۶۰
	مقدار احتمال	۰/۰۰۴	۰/۰۰۷	۰/۶۵۰

نوع خطای شایع‌تر در هر دو گروه خطای ارتکاب است که از نقص در بازداشتن پاسخ به سیگنال نو (بایست) ناشی می‌شود. خطای بازداری به‌معنای نقص در پاسخ‌گویی به سیگنال برو است. خطای ارتکاب به‌شیوه‌ی پاسخی ارتباط دارد که کنترل‌شده نبوده و واکنشی است. خطای بازداری نیز عوامل توجه و تمرکز را منعکس می‌سازد (۱۲). این مطالب مشخص می‌کند برخی کودکان لکتی توانایی کمی برای تطابق با شیوه‌ی پاسخ نشان می‌دهند؛ مثلاً کاهش واکنش‌هایشان بعد از تجربه‌کردن خطاها. همچنین به‌نظر می‌رسد بر این حقیقت دلالت داشته باشد که زمان‌های واکنش در خطاهای ارتکاب کودکان لکتی درمقایسه با گروه کنترل بسیار سریع‌تر است. تفسیر مذکور از یافته‌های سایر مطالعات حمایت می‌کند (۹) که زمان‌های واکنش کوتاه‌تری را در کودکان لکتی

۴ بحث

هدف از پژوهش حاضر بررسی دقیق‌تر توانایی کنترل بازداری در کودکان دارای لکت با استفاده از تکلیف برو- بایست کامپیوتری بود. نتایج این مطالعه نشان داد کودکان مبتلا به لکت تفاوت میانگین در کنترل بازداری درمقایسه با کودکان روان داشتند؛ اما این تفاوت‌ها به‌لحاظ آماری معنادار نبود. مطالعات قبلی براساس گزارش‌های والدین برای تفاوت‌های میانگین در کنترل بازداری بین کودکان لکتی و غیرلکتی بیان کردند کودکان مبتلا به لکت نمره کمی درمقایسه با گروه کنترل دارند (۳، ۴، ۷). هرچند این یافته‌ها در همه‌ی پژوهش‌ها تأیید نشد (۱۷).

گزارش کردند. این مشاهده درخور توجه است؛ به این علت که اکثر مطالعات قبلی نشان دادند افراد لکتی زمان‌های واکنش طولانی‌تری در مقایسه با افراد غیر لکتی دارند (۹).

نتایج پژوهش حاضر مطابق با یافته‌های قبلی با استفاده از CBQ است که در آن کودکان لکتی بازداری ضعیف‌تری داشتند (۴،۷)؛ ولی با یافته‌های مطالعه اندرسون تناقض دارد. آن‌ها گزارش کردند هیچ‌گونه تفاوت بین گروهی در کنترل بازداری بین کودکان لکتی و غیر لکتی مشاهده نمی‌شود (۱۷). دلیل تناقض نتایج این مطالعه با تحقیق اندرسون و همکاران می‌تواند به علت حجم نمونه کم (۹ لکتی و ۱۴ غیر لکتی) در مطالعه ایشان باشد.

این یافته که به نظر می‌رسد کودکان لکتی دارای توانایی کمتری برای تطابق دادن با شیوه پاسخ بعد از تجربه خطاها بوده، با مطالعه اندرسون و همکاران همسوست که در پژوهش مذکور کودکان لکتی نمره کمتری در مقیاس BSQ از سازش‌پذیری (سهولت یا مشکل در اینکه رفتارها می‌توانند به شیوه دلخواه تغییر کنند) در مقایسه با کودکان غیر لکتی داشتند (۱۸).

از سوی دیگر، نتایج مطالعه حاضر می‌تواند از دیدگاه خلق و خو تفسیر شود. کودکان با کنترل بازداری ضعیف توانایی کمتری جهت تنظیم موفقیت‌آمیز عواطف‌شان دارند (۱۰،۱۹). این قضیه منجر به بیشتر شدن پاسخ تحریک عاطفی در موقعیت‌های پراضطراب می‌شود. علاوه بر این ممکن است افزایش میزان وضعیت‌های مرتبط با اضطراب که کودکان لکتی با آن مواجه شده، به دلیل داشتن کنترل بازداری ضعیف، مانع توانایی ایشان برای نگهداشتن پاسخ‌های آن‌ها به اندازه کافی شود تا پیچیدگی موقعیتی خاص را در نظر گرفته و مهارت‌های اجتماعی مناسب را کسب کنند. نتایج مطالعه ایگرز نشان داد تحریک عاطفی و اضطراب، ظرفیتی برای بدتر شدن علائم لکتی دارد (۲۰)؛ در نتیجه کنترل بازداری کمتر، ممکن است میزان تحریک عاطفی را افزایش دهد که برخی کودکان لکتی در موقعیت‌های اضطراب‌آور تجربه می‌کنند و نیز بر علائم لکتی تأثیر بگذارد. این موضوع به موازات یافته‌های مبتنی بر پرسشنامه است که تنظیم عاطفی نامطلوب را در کودکان لکتی گزارش کرده و حمایتی را برای واکنش‌پذیری عاطفی‌شان بر اساس مدل تنظیم و لکتی فراهم می‌آورد. در این مدل، تنظیم عاطفی و واکنش‌پذیری به عنوان عواملی در نظر گرفته می‌شود که بدتر شدن یا حفظ لکتی دوران رشد را به دنبال دارد (۸).

نتایج این پژوهش می‌تواند کاربردهای بالینی ارزشمندی برای درمان‌گران داشته باشد. کودکان مبتلا به لکتی که کنترل بازداری ضعیفی

نشان می‌دهند، احتمالاً مشکل‌هایی در متوقف کردن پاسخ‌های غالب در وضعیت‌های مختلف مثل مدرسه و بازی با دوستان دارند؛ بنابراین باید به والدین مشاوره داده شود که این کودکان ممکن است دارای معضله‌های بیشتری در مواجهه با موقعیت‌های روزانه بوده که نیازمند پاسخ است؛ مثل دنبال کردن دستور عمل‌ها، منتظر ماندن برای چیزی، پایان دادن فعالیتی به دلیل درخواست از وی. این مطلب، افزایش تحریک عاطفی را در پی دارد؛ در نتیجه تکنیک‌های راهنمای والدین مانند دادن زمان بیشتر به کودک باید استفاده گردد و نیز به او کمک شود تا رفتارهای خودتنظیمی را فراگیرد. فعالیت‌هایی که سبب افزایش رفتارهای خودتنظیمی می‌شود، شامل تشخیص موقعیت‌های مشکل، بحث در زمینه رفتارهای انتظار داشته، کمک به کودک جهت استفاده از گفتار خود جهت‌یابی شده و به کارگیری یادآوری‌کننده‌ها است؛ رویکردهای مذکور در کودکان لکتی مشابه راهکارهای حل مسئله‌ای است که در اکثر برنامه‌های درمانی لکت مبتنی بر اصول شناختی به کار می‌رود (۲۰). هدف این راهکارها کم کردن تحریک عاطفی بوده که در نتیجه منجر به کاهش علائم لکت می‌شود. یافته‌های مطالعه حاضر همچنین نشان می‌دهد که برخی کودکان مبتلا به لکت، کارایی کمتری در تغییر شیوه پاسخ‌شان دارند، مثل کند کردن بعد از تجربه خطاهای پاسخ؛ ممکن است این موضوع سبب طولانی‌تر شدن کشیده‌گویی‌های صدا یا تکرارها شود (۲۰).

نتایجی که در این مطالعه بیان شد باعث معترسازی اجزای درمان لکت می‌شود که به مراجعان اجازه می‌دهد تا الگوهای گفتارشان را کنترل کرده و تغییر دهند؛ مانند افزایش کنترل گفتار خودشان، ارائه بازخورد عمقی، تغییر سرعت گفتار و ارائه بازخورد مثبت برای گفتار روان به جای گفتار ناروان (۲۰). در این پژوهش به لحاظ آماری تفاوت معناداری در متغیرهای تکلیف برو-بایست مشاهده نشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که برای رسیدن به تفاوت معنادار بر حسب محاسبه توان آزمون، توانایی کنترل بازداری در جمعیت وسیع‌تری بررسی شود.

۵ نتیجه‌گیری

یافته‌های این مطالعه بر اساس تکلیف برو-بایست شنیداری، نشان داد که کودکان لکتی و غیر لکتی در کنترل بازداری دارای تفاوت معناداری نیستند. همچنین بین دو گروه کودکان مبتلا به لکت و غیر لکتی در متغیرهای ارتکاب و بازداری و زمان واکنش تفاوت معناداری وجود ندارد. انجام این مطالعه با نمونه‌های بیشتری پیشنهاد می‌شود.

References

1. Carlson SM, Wang TS. Inhibitory control and emotion regulation in preschool children. *Cogn Dev.* 2007;22(4):489-510. doi:[10.1016/j.cogdev.2007.08.002](https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2007.08.002)
2. Carlson SM, Moses LJ. Individual differences in inhibitory control and children's theory of mind. *Child Dev.* 2001;72(4):1032-53. doi:[10.1111/1467-8624.00333](https://doi.org/10.1111/1467-8624.00333)
3. Eggers K, De Nil LF, Van den Bergh BRH. Inhibitory control in childhood stuttering. *J Fluency Disord.* 2013;38(1):1-13. doi:[10.1016/j.jfludis.2012.10.001](https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2012.10.001).
4. Eggers K, De Nil LF, Van den Bergh BR. Temperament dimensions in stuttering and typically developing children. *J Fluency Disord.* 2010;35(4):355-72. doi:[10.1016/j.jfludis.2010.10.004](https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2010.10.004)
5. Rothbart MK, Ahadi SA, Hershey KL, Fisher P. Investigations of temperament at three to seven years: the children's behavior questionnaire. *Child Dev.* 2001;72(5):1394-408. doi:[10.1111/1467-8624.00355](https://doi.org/10.1111/1467-8624.00355)
6. Rothbart MK, Sheese BE, Rueda MR, Posner MI. Developing mechanisms of self-regulation in early life. *Emotion review.* 2011;3(2):207-13. doi:[10.1177/1754073910387943](https://doi.org/10.1177/1754073910387943)
7. Embrechts M, Ebben H, Franke P, Van de Poel C. Temperament: A comparison between children who stutter and children who do not stutter. In *Proceedings of the Third World Congress on Fluency Disorders: Theory, research, treatment, and self-help 2000* (pp. 557-562).
8. Karrass J, Walden TA, Conture EG, Graham CG, Arnold HS, Hartfield KN, et al. Relation of emotional reactivity and regulation to childhood stuttering. *J Commun Disord.* 2006;39(6):402-23. doi:[10.1016/j.jcomdis.2005.12.004](https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2005.12.004)
9. Eggers K, De Nil LF, Van den Bergh BR. The efficiency of attentional networks in children who stutter. *J Speech Lang Hear Res.* 2012;55(3):946-59. doi:[10.1044/1092-4388\(2011/10-0208\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2011/10-0208)
10. Rothbart MK, Ellis LK, Rueda MR, Posner MI. Developing mechanisms of temperamental effortful control. *J Pers.* 2003;71(6):1113-44. doi:[10.1111/1467-6494.7106009](https://doi.org/10.1111/1467-6494.7106009)
11. Rueda MR, Fan J, McCandliss BD, Halparin JD, Gruber DB, Lercari LP, et al. Development of attentional networks in childhood. *Neuropsychologia.* 2004;42(8):1029-40. doi:[10.1016/j.neuropsychologia.2003.12.012](https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2003.12.012)
12. Baron IS. *Neuropsychological evaluation of the child.* First edition. New York, USA: Oxford University Press; 2003.
13. Eggers K, De Nil LF, Van den Bergh BR. Exogenously triggered response inhibition in developmental stuttering. *J Fluency Disord.* 2018;56:33-44. doi:[10.1016/j.jfludis.2018.02.001](https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2018.02.001)
14. Tahmasebi N, Shafie B, Karimi H, Mazaheri M. A Persian-version of the stuttering severity instrument-version four (SSI-4): How the new additions to SSI-4 complement its stuttering severity score? *J Commun Disord.* 2018;74:1-9. doi:[10.1016/j.jcomdis.2018.04.005](https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2018.04.005)
15. Shahim S. *IQ Wechsler revised scale.* Sixth edition. Shiraz, Iran: Shiraz University; 2011. [Persian]
16. Khodadadi M, Khorrani A, Amani H. *Go/No Go Software.* Institute for Behavioral and Cognitive Sciences. Tehran: Islamic Republic; 2014. [Persian]
17. Anderson JD, Wagovich SA. Relationships among linguistic processing speed, phonological working memory, and attention in children who stutter. *J Fluency Disord.* 2010;35(3):216-34. doi:[10.1016/j.jfludis.2010.04.003](https://doi.org/10.1016/j.jfludis.2010.04.003)
18. Anderson JD, Pellowski MW, Conture EG, Kelly EM. Temperamental characteristics of young children who stutter. *J Speech Lang Hear Res.* 2003;46(5):1221-33. doi:[10.1044/1092-4388\(2003/095\)](https://doi.org/10.1044/1092-4388(2003/095)
19. Kochanska G, Murray K, Jacques TY, Koenig AL, Vandegest KA. Inhibitory control in young children and its role in emerging internalization. *Child Dev.* 1996;67(2):490-507. doi:[10.1111/j.1467-8624.1996.tb01747.x](https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1996.tb01747.x)
20. Eggers K, Jansson-Verkasalo E. Auditory attentional set-shifting and inhibition in children who stutter. *J Speech Lang Hear Res.* 2017;60(11):3159-70. doi:[10.1044/2017_JSLHR-S-16-0096](https://doi.org/10.1044/2017_JSLHR-S-16-0096)